



COMMENT UTILISER CE GUIDE DES FOURMIS ?


Dans ce guide, les fourmis sont classées en **4 groupes** :



1^{er} groupe : les **Ponérines** montrent un pétiole (p) haut et un étranglement marqué entre le 1^{er} et le 2^e segment de l'abdomen (flèche) ► p. 58.




2^e groupe : les **Dolichodérines** ont un pétiole bas et pas d'étranglement entre le 1^{er} et le 2^e segment de l'abdomen ; 4 segments visibles à l'abdomen ► p. 60.



pétiole

3^e groupe : les **Formicines** ont un pétiole bas et pas d'étranglement entre le 1^{er} et le 2^e segment de l'abdomen ; 5 segments visibles à l'abdomen ► p. 70.



pétiole et post-pétiole

4^e groupe : les **Myrmicines** montrent deux segments, pétiole (p) et post-pétiole (pp), entre le thorax et l'abdomen ► p. 104.

1. Commencez d'abord par choisir le groupe dans lequel s'inscrit votre fourmi :

Puis, laissez-vous guider par les onglets !

2. Supposons que la fourmi que vous souhaitez identifier appartienne manifestement aux Formicines (voir ci-contre), **rendez-vous alors p. 70.**

Là, commencez à lire les onglets en haut de page.

Trois choix s'offrent à vous en lisant de gauche à droite :

Profil du thorax
sans cassure

Profil du thorax
avec une cassure

Profil du thorax
avec une bosse

Nom latin

Description

Description concise des caractères importants pour l'identification

Habitat, mode de vie, observations

Ce qu'il faut savoir sur la biologie de l'espèce

Distribution

Les zones géographiques de présence de l'espèce en France

Iconographie

Plusieurs photographies présentent l'espèce sous toutes ses formes, en mettant l'accent sur les caractères importants pour l'identification

Camponotus cruentatus

Sous-famille des Formicines

Caractères distinctifs : ouvrières de taille moyenne à grande (6 à 12 mm) suivant un **polymorphisme continu** ; les ouvrières sont noires avec l'arrière du thorax et le début de l'abdomen rougeâtre ; elles ont un aspect mat.

Habitat : *Camponotus cruentatus* vit dans les milieux ouverts et chauds, et niche sous les pierres.

Mode de vie : espèce omnivore avec une préférence pour les substances sucrées (nectar de plantes, excrétion de pucerons, fruits mûrs).

Observations : les colonies ont une seule reine et sont très territoriales. Les ouvrières sont agressives lorsqu'elles sont dérangées.

Distribution : espèce présente sur le pourtour méditerranéen.



Ouvrière majeure de *Camponotus cruentatus*



Ouvrière majeure de *Camponotus cruentatus*

74/75



Si vous observez une fourmi avec un thorax sans cassure, vous êtes au bon endroit !

2. Puis faites votre choix dans les onglets du côté droit, en lisant de haut en bas.

3. Et enfin dans les onglets du bas, en lisant de droite à gauche.